

ماركة حقيقية
25 سنة من الخبرة

خبراء في مجال التغذية الحيوانية

RALTEC

جودة محمية

رالتيك - أسبانيا

أخصائيين في خفض
النفقات

(الفطام ، التسمين ، الحليب)

لبرامج متقدمة في مجال
تغذية الحيوان



SERVERAM S.L.

Ap. Correos 141 - 08500 VIC (Barcelona) Spain

Tel. 93 888 77 80 - Fax. 93 812 21 28

Internet: www.serveram.com

E-mail: info.raltec@serveram.com

GLOBAL NUTRITION

خبراء في مجال التغذية الحيوانية

RALTEC

جودة محمية

مواد جديدة للإمالة سوبريم

REHIDRAMAX

مادة الإمالة بوظائفها الثلاثة : للإمالة والتغذية والحد من المشاكل المعوية

نقوم منذ أعوام بدراسة سوق العجول الرضع العالمية وبعض الأبقار البالغة كذلك عند تفريقها عن إمالتها والمستهلكة لكمية كبيرة من السوائل الحليب في هذا المراحل تتعرض الأبقار إلى الانتقال وعمليات جديدة ومزارع وغذاء جديد بالإضافة إلى تغيرات الحرارة القاسية وتناول كمية قليلة من السوائل يمكن ان تصل نسبة الوفاة/النفوق بين هذه الأبقار في هذه المرحلة (الأيام العشرين الأولى) إلى نسبة عالية جداً إن لم نتبع جميع اجراءات الوقاية اللازمة تعويض السوائل لعلاج الجفاف يمكن أن تعاني الحيوانات من قلة التغذية والتي قد تؤدي إلى مشكلتين أساسيتين: انخفاض حرارة الجسم وجفافه أ- في فصل الشتاء وبسبب البرد والرطوبة الجوية يمكن لحرارة العجل أن تنخفض بشكل كبير وقد يسبب هذا موته في المرحلة الأولى أو الثانية ب- في فصل الصيف أو في مراحل الحرارة العالية جداً يفقد الحيوان بين 20 إلى 30% من نسبة 80% من سوائل كتلته الجسدية وتبدأ حالة العطش والجفاف الشديد يمكن أن ترتفع حالات الموت الوفاة/النفوق بشكل كبير يقوم المنتج ريهيدراماكس بحل هذه المشكلة ومنح الحيوانات الرضع ما تحتاجه من الغذاء كي تسترجع ما فقدته من العناصر الغذائية في هذه المرحلة

جدول الاستخدام جرعة وقاية

الجرعات التي ينصح بها للعجول والبقرات الصغيرة والجاموس	ماء حار
(اليوم الأول 150 غرام ريهيدراماكس لكل 1,5 لتر من الماء (مرتين في اليوم)	↓
(اليوم الثاني 75 غرام ريهيدراماكس لكل 1,5 لتر من الماء (مرتين في اليوم)	
(اليوم الثالث 75 غرام ريهيدراماكس لكل 1,5 لتر من الماء (مرتين في اليوم)	
(اليوم الرابع إلى الخامس عشر 10 غرام ريهيدراماكس لكل 1,5 لتر من الماء (مرتين في اليوم)	
بعد 10 أو 15 يوماً يجب ضبط الجرعات حسب حاجة الحيوانات الغذائية	

الجرعات التي ينصح بها للأغنام والماعز	ماء حار
اليوم الأول إعطاء الحيوان ريهيدراماكس 20 غرام يومية لكل لتر من الحليب لكل حيوان	↓
اليوم الثاني إعطاء الحيوان ريهيدراماكس 10 غرام يومية لكل لتر من الحليب لكل حيوان	
اليوم الثالث إعطاء الحيوان ريهيدراماكس 10 غرام يومية لكل لتر من الحليب لكل حيوان	
اليوم الرابع إعطاء الحيوان ريهيدراماكس 10 غرام يومية لكل لتر من الحليب لكل حيوان	
من اليوم الخامس حتى الخامس عشر إعطاء الحيوان ريهيدراماكس 5 غرام يومية لكل لتر من الحليب لكل حيوان	

نصائح:

في حال تعرض الحيوان لالتهاب أمعاء مزمن يجب منع الحليب عنه وإعطائه الجرعات حسب الجدول